



دفترآموزش و ارتقای سلامت

۷ توصیه ورزشی به مبتلایان دیابت

پا به پای دیابت راه بروید!



آن‌هاست. ترکیبی کار کنید و مراقب آسیب‌های جزئی ورزش باشید چون بدن یک فرد دیابتی به خاطر آسیب عروق و اعصاب کوچک، هم زودتر آسیب می‌بیند، هم دیرتر بهبود می‌یابد. کفشه راحت و مناسب بپوشید و ورزش‌های خشن انجام ندهید.

۶ کنترل قند خون بعد از ورزش: مدتی بعد از پایان ورزش هم باید قندخونتان را اندازه بگیرید. ممکن است چند ساعت بعد از ورزش ناگهان با افت شدید قند مواجه شوید؛ چون عضلات موقع ورزش قند ذخیره خود را مصرف می‌کنند و بعد از اتمام ورزش به سراغ قندخون می‌روند تا ذخایر مصرفی را جبران کنند.

۷ ورزش منظم و مناسب با شرایط: ورزش و فعالیت بدنی باید مناسب با شرایط و وضعیت سلامت شخص باشد و به طور منظم و مستمر انجام گیرد. زمان ورزش بهتر است عصر باشد. شما می‌توانید ورزش‌های سبک مثل نرمش و پیاده‌روی انجام دهید یا با پیشک خود دریاره نوع ورزشی که انجام می‌دهید مشورت کنید. ورزش، به خصوص ورزش‌های هوایی، باعث تقویت دستگاه قلب و گردش خون نیز می‌شود و این امر در افراد دیابتی از اهمیت سییار زیادی برخودار است و به آنها کمک می‌کند از خطر سکته‌های قلبی و مغزی نایینایی و آسیب‌های عصبی در امان بمانند.

۱ پیاده‌روی روزانه: ۳۰ دقیقه پیاده‌روی روزانه! این معمولاً اولین چیزی است که به بیمار دیابتی توصیه می‌شود. ورزش علاوه بر کاهش وزن بدن و کمک به تناسب اندام، باعث کاهش خطر بیماری‌های قلبی می‌شود و از عوامل مهم کنترل قندخون به حساب آید. اما دیابتی‌ها در این مورد هم نباید بی‌گدار به آب مزنند چون آنها مجاز نیستند هر ورزشی را هرچقدر که دلشان خواست، انجام دهند. پس قبل از شروع هر ورزشی، از پیشگیرانه اجتازه بگیرید و درباره نوع، شدت و مدت ورزش‌تان با پزشک مشورت و از اسوال کنید که چگونه باید داروهایتان را قبل و بعد از ورزش مصرف کنید.

۲ کنترل قند خون قبل از ورزش: اگر انسوینین می‌زنید، ۳۰ دقیقه قبل از شروع ورزش، قند خونتان را چک کنید تا موقع ورزش با افت شدید قند مواجه نشوید.

۳ پی‌گدار به آب نزدیک: قبل از ورزش، قند خونتان را با گلوكومتر اندازه بگیرید. اگر قندتان بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ بود، با خیال راحت ورزش کنید اما اگر قندتان زیر ۱۰۰ یا بالای ۲۵۰ بود، بهتر است موقعتاً دور ورزش را خط بکشید تا وضعیت‌تان متغیر شود؛ و گرنه در حالت اول، ممکن است دچار افت شدید قند خون (حمله هیپوگلیسمی) و بیهوشی شوید و در حالت دوم، دچار حمله تکنوسیدور و کاهش سطح هوشیاری. اگر قند خونتان زیر ۱۰۰ بود، حتماً باید ابتدا یک وعده مختصراً غذای حاوی کربوهیدرات‌ها مقداری میوه و بیسکوئیت بخوردید، کمی صیر کنید و بعد به ورزش بپردازید.

۴ شناسایی علایم افت قندخون: اگر می‌خواهید طولانی مدت ورزش کنید، باید هر نیم ساعت قند خونتان را اندازه بگیرید. اگر قندتان زیر ۷۰ بود یا دچار ضعف و بدن‌لرزه شدید، باید ورزش را قطع کنید و یک چیز شیرین بخوردید؛ مثلاً آبمیوه، شکلات یا آبنبات.

۵ کفشه راحت و مناسب: ترکیب ورزش‌های هوایی با ورزش‌های قدرتی، مؤثرتر از انجام یکی از